

PROGRAMA PREVENTIVO EN POLLOS DE ENGORDE



Edad (sem)	Edad (días)	Agua de bebida	Pulverización
1	Neo Tc + Celtz EF del día 1 al 5	Neo Tc (Oxitetraciclina+Neomicina). 1 sobre en 500 litros de agua Celtz EF (Electrolitos y vitaminas). 2 tabletas en 250 litros de agua Germon 50 (1lt en 10.000 litros de agua)	Germon 50 10cc por mochila de 20 litros
2			Germon 50 : 3 veces a la semana, 10 cc por mochila de 20 litros hasta el final del lote
3	Coccidine del día 19 al 21	Coccidine (Sulfaquinoxalina + Diaveridine) 1 litro en 1.000 litros de agua (ajustar según día de cambio de balanceado)	Germon 50 : 3 veces a la semana, 10 cc por mochila de 20 litros
4			Germon 50 : 3 veces a la semana, 10 cc por mochila de 20 litros
5			Germon 50 : 3 veces a la semana, 10 cc por mochila de 20 litros
6			Germon 50 : 3 veces a la semana, 10 cc por mochila de 20 litros
<p>* Durante la 1ra y 2da vacunación, administrar Suplem por 3 días</p> <p>** Suspender la pulverización y administración de Germon 50 en agua de bebida 24 horas antes, durante y hasta 24 horas posteriores a la vacunación</p>			

Casa central: Ruta 2 Km16,5 Tel: 0228- 633310 /633200 casacentral@agroequipos.com.py

Sucursal: Bella Vista Tel: 0767- 240727 bellavista@agroequipos.com.py

